

الوثيقة المرفقة باستمارة الموافقة على اللقاح المضاد لكوفيد-19

مذكرة إعلامية

لقاح مودرنا

ما هو لقاح مودرنا؟ و ما الفائدة منه؟

مودرنا هو لقاح للوقاية من فيروس كورونا (السارس كوفي-2) المسبب لمرض كوفيد-19 و يستهدف اللقاح الفئات التي تبلغ أعمارها 18 سنة فأكثر.

يقوم اللقاح بتحفيز الجهاز المناعي (الدفاع الطبيعي للجسم) على إنتاج مضادات الأجسام (الأضداد) و خلايا دموية نشيطة ضد الفيروس و بالتالي الوقاية من العدوى. وبما أن لقاح مودرنا لا يعتمد تقنية الفيروس لتحفيز المناعة فهو لا يتسبب في كوفيد-19.

قبل تلقي اللقاح من المهم معرفة ما يلي:

لا يمكن تلقي لقاح مودرنا في حالة رد فعل تحسسي سابق تجاه المكون النشط للقاح أو أحد المكونات الأخرى الوارد ذكرها لاحقاً.

ضرورة توخي الحذر

يجب إطلاع الطبيب أثناء استشارة ما قبل اللقاح إذا كانت تنطبق عليك الحالات التالية:

- ظهور رد فعل تحسسي خطير أو ضيق في التنفس بعد تلقي لقاحات أخرى أو لقاح مودرنا في الماضي
- الإغماء بعد الحقن
- المرض الحاد المرفق بحمى واضحة أما في حالة الحمى الخفيفة أو الالتهاب البسيط للمسالك التنفسية مثل الزكام فمن الممكن تلقي اللقاح
- المعاناة من اضطرابات دموية أو تشكل كدمات على الجلد أو اتباع علاج مضاد لتخثر الدم
- المعاناة من نقص المناعة بسبب مرض الأيدز (السيدا) أو تناول أدوية تؤثر على الجهاز المناعي مثل الكورتيكوستيرويد

الأدوية الأخرى و لقاح مودرنا

يتوخى إطلاع الطبيب أو العامل بمركز اللقاح على الأدوية المستعملة أو أي لقاح تلقىته مؤخراً.

الحمل و الرضاعة

في حالة الحمل أو احتمال الحمل أو الرضاعة يجب إبلاغ الطبيب قبل تلقي هذا التلقيح.

لا تكفي المعطيات المتاحة حالياً لتقييم استعمال اللقاح لدى النساء الحوامل.

لم تثبت الدراسات التي همت الحيوانات أضراراً مباشرة أو غير مباشرة على الحمل أو على تطور الجنين أو الولادة أو فترة ما بعد الولادة.

ويتم أخذ لقاح مودرنا بعين الاعتبار أثناء الحمل فقط إذا كانت منافعه تفوق المخاطر المحتملة على كل من الأم و الجنين.

مدى نجاعة اللقاح و مدة المناعة

ليس معروفاً حتى الآن كم تدوم المناعة من تلقي اللقاح و لا زالت الدراسات جارية لتحديد ذلك.

كباقي اللقاحات، من الممكن ألا يمنح لقاح مودرنا الوقاية من كوفيد-19. و يعتقد أن الحصول على المناعة الكافية لا يتسنى إلا بعد مرور 14 يوماً من تلقي الجرعة الثانية. لهذا ينبغي الاستمرار في إتباع التدابير الوقائية التي توصي بها المصالح المختصة (ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي و غسل اليدين باستمرار).

كيفية تلقي اللقاح

يتم لقاح مودرنا عن طريق الحقن العضلي بأعلى الذراع (العضلة الدالية). و هو لقاح من جرعتين، تعطى الجرعة الثانية بعد 4 أسابيع من الأولى (يمكن تمديد الفاصل الزمني بين الجرعتين إلى 42 يوماً على الأكثر).
من الضروري تلقي الجرعتين لضمان مناعة جيدة. في حال نسيان تلقي الجرعة الثانية في الموعد المحدد يجب الإتصال بالطبيب المعالج أو نفس مركز التلقيح للجرعة الأولى.

الآثار الجانبية المحتملة للقاح

كباقي اللقاحات، قد يسبب لقاح مودرنا بعض الآثار الجانبية عند بعض الأشخاص.
الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً (تهد أكثر من شخص واحد من أصل 10 أشخاص):

- انتفاخ منطقة تحت الإبط
- ألم الرأس
- الغثيان و القيء
- ألم العضلات والمفاصل و التشنج
- الألم أو التورم في مكان الحقن
- العياء الشديد
- القشعريرة، الحمى

الآثار الجانبية الشائعة (تهد شخصا واحداً من أصل 10 أشخاص):

- طفح جلدي
- إحمراؤ أو حساسية جلدية مثل الشرى (الأرتيكاريا) مكان حقن الدواء
- الآثار الجانبية غير الشائعة (تهد شخصا واحداً كل من أصل 100 شخص):
- الحكّة على مستوى مكان الحقن.

الآثار الجانبية النادرة (تهد شخصا واحداً من أصل 1000 شخص):

- شلل الوجه النصفي المؤقت (شلل بيل)
- انتفاخ الوجه (يظهر لدى الأشخاص الذين خضعوا لحقن التجميل على مستوى الوجه)

و من غير المعروف حدوث رد فعل تحسسي خطير (لا يمكن تحديده بناء على المعطيات المتاحة).
في حال ظهور أي رد فعل، و لو لم يدرج ضمن الآثار المشار إليها أعلاه، يتوخى إخبار الطبيب المعالج أو مركز التلقيح.
من الممكن الإعلام عن الآثار الجانبية مباشرة عبر البرنامج الوطني للمراقبة التابع لوكالة الأدوية الإيطالية

(<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>)

العناصر المكونة للقاح

يحتوي هذا اللقاح على العناصر المكونة الآتية:

العنصر النشط هو الحمض النووي الريبي المرسال (الرنا المرسال) المضاد لكوفيد-19

العناصر المكونة الأخرى إضافة إلى سائل الحقن هي:

lipide SM-102, colesterolo, 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC), 1,2- dimiristoil-rac-glicero-3-metossipolietilenglicole-2000 (PEG2000 DMG), trometamolo, trometamolo cloridrato, acido acetico, sodio acetato triidrato, saccarosio.